

# こどもの定期予防接種の対象者とスケジュール



種類	対象者	接種回数と間隔	標準的接種期間	予診票配布方法
BCG(結核)	生後1歳未満	1回	生後5か月~8か月未満	赤ちゃん訪問
(令和6年4月1日~) <b>5種混合</b> (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ) <b>4種混合</b> (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) 5種混合を接種した場合は不要なワクチンです	生後2か月~90か月未満	<b>【初回】</b> 20日以上の間隔で3回	<b>5種混合</b> 生後2か月~7か月未満で開始 <b>4種混合</b> 生後2か月~12か月未満	赤ちゃん訪問
		<b>【追加】</b> 初回接種終了後、6か月以上あけて、1回	<b>5種混合</b> 初回接種終了後6~18か月の間隔をおく <b>4種混合</b> 初回接種終了後12~18か月の間隔をおく	
ヒブ(Hib) ※1 5種混合を接種した場合は不要なワクチンです	生後2か月~5歳未満	<b>【初回】</b> 27日以上の間隔で3回接種	生後2か月~7か月未満	赤ちゃん訪問
		<b>【追加】</b> 初回接種終了後7か月以上あけて1回	初回接種終了後7か月~13か月の間隔をおく	
小児用肺炎球菌 ※1	生後2か月~5歳未満	<b>【初回】</b> 27日以上の間隔で3回接種	生後2か月~7か月未満	赤ちゃん訪問
		<b>【追加】</b> 初回接種終了後60日以上の間隔をあけて、生後12か月に至った日以降に1回	生後12か月~15か月未満	

種類		対象者	接種回数と間隔	標準的接種期間	予診票配布方法
B型肝炎		1歳未満	【初回】 27日以上の間隔をあけて2回  【追加】 1回目の接種から139日以上あけて1回	生後2か月～9か月未満	赤ちゃん訪問
ロタ	ロタテック®	生後32週まで(約7か月半)	それぞれ27日以上の間隔をあけて3回接種	生後2か月以降。 ※1回目接種は、生後14週6日後までに受けてください。	赤ちゃん訪問
	ロタリックス®	生後24週まで(約5か月半)	それぞれ27日以上の間隔をあけて2回接種		
麻しん風疹(MR)		【1期】 1歳～2歳未満	1回	1歳の誕生日を迎えたら早めに	9・10か月健診で配布
		【2期】 小学校就学前の1年間	1回	予診票が届いたら早めに	年長学年に郵送
水痘		生後12か月～生後36か月未満	3か月以上あけて2回	【1回目】 生後12か月～15か月未満  【2回目】 1回目の接種後6か月～12か月の間隔をおく	9・10か月健診で配布
日本脳炎※2		【1期】 生後6か月～90か月未満	【初回】 6日以上の間隔で2回	3～4歳未満 (6日～28日の間隔をおいて)	3歳児健診で配布
			【追加】 初回接種終了後6か月以上あけて1回	4～5歳未満 (初回接種終了後概ね1年あける)	
		【2期】 9歳以上13歳未満	1回	9～10歳未満	小学4年生に郵送

種類	対象者	接種回数と間隔	標準的接種期間	予診票配布方法
二種混合	11歳以上13歳未満	1回	11歳～12歳未満	小学6年生に郵送
ヒトパピローマウイルス (HPV) ※3	小学6年生～高校1年生相当の女子	ワクチンの種類、接種開始年齢によって変わります。詳細は、案内をご覧ください。	中学1年生	中学1年生の女子に郵送

加茂管内以外の県内の医療機関で接種される方は、別途申請が必要になりますので、ご連絡ください。

※1 ヒブ、小児用肺炎球菌は、接種の時期により、接種回数、スケジュールが変わりますので、詳しくは、「予防接種とこどもの健康」をご覧ください。保健センターまでお問い合わせください。

※2 接種回数が不足している平成16年4月2日～平成19年4月1日生まれで定期接種(計4回)が完了していない20歳未満の方は「日本脳炎特例措置」をご覧ください。

※3 平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれの助成で定期接種(計3回)が完了していない方は「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種」をご覧ください。