

こどもの定期予防接種の対象者とスケジュール



R8.4.1

種類		対象者	接種回数と間隔	標準的接種期間	予診票配布方法
BCG(結核)		生後1歳未満	1回	生後5か月～8か月未満	赤ちゃん訪問
5種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)		生後2か月～90か月未満	【初回】 20日以上の間隔で3回	生後2か月～7か月未満で開始	赤ちゃん訪問
			【追加】 初回接種終了後、6か月以上あけて、1回	初回接種終了後6～18か月の間隔をおく	
小児用肺炎球菌 ※1		生後2か月～5歳未満	【初回】 27日以上の間隔で3回接種	生後2か月～7か月未満	赤ちゃん訪問
			【追加】 初回接種終了後60日以上の間隔をあけて、生後12か月に至った日以降に1回	生後12か月～15か月未満	
B型肝炎		1歳未満	【初回】 27日以上の間隔をあけて2回	生後2か月～9か月未満	赤ちゃん訪問
			【追加】 1回目の接種から139日以上あけて1回		
ロタ	ロタテック®	生後32週まで(約7か月半)	それぞれ27日以上の間隔をあけて3回接種	生後2か月以降。 ※1回目接種は、生後14週6日後までに受けてください。	赤ちゃん訪問
	ロタリックス®	生後24週まで(約5か月半)	それぞれ27日以上の間隔をあけて2回接種		

種類	対象者	接種回数と間隔	標準的接種期間	予診票配布方法
麻疹風疹(MR)	【1期】 1歳～2歳未満	1回	1歳の誕生日を迎えたら早めに	9・10か月健診で配布
	【2期】 小学校就学前の1年間	1回	予診票が届いたら早めに	年長学年に郵送
水痘	生後12か月～生後36か月未満	3か月以上あけて2回	【1回目】 生後12か月～15か月未満 【2回目】 1回目の接種後6か月～12か月の間隔をおく	9・10か月健診で配布
日本脳炎※2	【1期】 生後6か月～90か月未満	【初回】 6日以上の間隔で2回	3～4歳未満 (6日～28日の間隔において)	3歳児健診で配布
		【追加】 初回接種終了後6か月以上あけて1回	4～5歳未満 (初回接種終了後概ね1年あける)	
	【2期】 9歳以上13歳未満	1回	9～10歳未満	小学4年生に郵送
二種混合(DT)	11歳以上13歳未満	1回	11歳～12歳未満	小学6年生に郵送
ヒトパピローマウイルス(HPV)	小学6年生～高校1年生相当の女子	接種開始年齢によって変わります。詳細は、案内をご覧ください。	中学1年生	中学1年生の女子に郵送

※1 小児用肺炎球菌は、接種の時期により、接種回数、スケジュールが変わりますので、詳しくは、「予防接種とこどもの健康」をご覧ください。保健センターまでお問い合わせください。

※2 接種回数が不足している平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれて定期接種(計4回)が完了していない20歳未満の方は「日本脳炎特例措置」をご覧ください。